

Dénomination du médicament

**ALLERGOCOMOD, collyre en solution**  
**Cromoglycate de sodium**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALLERGOCOMOD, collyre en solution et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALLERGOCOMOD, collyre en solution ?
3. Comment utiliser ALLERGOCOMOD, collyre en solution ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALLERGOCOMOD, collyre en solution ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE ALLERGOCOMOD, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : ANTI-ALLERGIQUE (S= Organe sensoriel) - S01GX01

Ce collyre est indiqué en cas de maladie de l'œil d'origine allergique (conjonctivite allergique).

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALLERGOCOMOD, collyre en solution ?**

**N'utilisez jamais ALLERGOCOMOD, collyre en solution :**

- si vous êtes allergique au cromoglycate de sodium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ALLERGOCOMOD, collyre en solution.

**Faites attention avec ALLERGOCOMOD, collyre en solution :**

- NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.
- NE PAS INJECTER, NE PAS AVALER.
- Ne pas dépasser la posologie recommandée.
- En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.
- Reboucher le flacon après utilisation.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Autres médicaments et ALLERGOCOMOD, collyre en solution**

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

### **ALLERGOCOMOD, collyre en solution avec des aliments et boissons**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse si besoin. L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation du collyre. Dans ce cas attendre la fin des symptômes pour conduire un véhicule ou utiliser une machine.

### **ALLERGOCOMOD, collyre en solution contient de l'Edétate de sodium**

### **3. COMMENT UTILISER ALLERGOCOMOD, collyre en solution ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### **Posologie**

- Adulte et enfant : selon la sévérité des symptômes, instillez 1 goutte dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour, à intervalles réguliers.  
Chez l'enfant, un avis médical est nécessaire.
- Ne dépassez pas la dose recommandée.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

#### **Mode et voie d'administration**

Voie locale. EN INSTILLATION OCULAIRE.

- Lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.
- Instillez 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival de l'œil malade en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière vers le bas, et en évitant le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.
- Rebouchez le flacon après utilisation.

#### **Fréquence et d'administration**

Espacez les 2 à 6 instillations quotidiennes.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre chaque instillation.

#### **Durée du traitement**

Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

**Si vous avez utilisé plus de ALLERGOCOMOD, collyre en solution que vous n'auriez dû**

Sans objet.

**Si vous oubliez d'utiliser ALLERGOCOMOD, collyre en solution**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d'utiliser ALLERGOCOMOD, collyre en solution**

Sans objet.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Possibilité de survenue :

- de réaction allergique aux composants du produit,
- de gêne visuelle passagère après instillation du collyre.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER ALLERGOCOMOD, collyre en solution ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Après la première ouverture du flacon, la solution ophtalmique stérile ne doit pas être utilisée pendant plus de 12 semaines.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient ALLERGOCOMOD, collyre en solution**

- La substance active est :

Cromoglycate de sodium.....	2,000
g	
Quantité correspondant à acide cromoglycique.....	1,830
g	

Pour 100 ml

- Les autres composants sont : Edétate de sodium, sorbitol, eau pour préparations injectables

## **Qu'est-ce que ALLERGOCOMOD, collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de collyre en solution. Boîte de 1 flacon.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

#### **LABORATOIRES URSAPHARM**

7, RUE DENIS PAPIN

57200 SARREGUEMINES

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

#### **LABORATOIRES DELBERT**

49 RUE ROUELLE

75015 PARIS

### **Fabricant**

#### **URSAPHARM ARZNEIMITTEL**

INDUSTRIESTRASSE

66129 SARREBRUCK

ALLEMAGNE

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

### **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).